

CANCERS DE LA PEAU NON MÉLANOME

Le carcinome basocellulaire (CBC)

Il peut prendre la forme d'un nodule avec parfois une plaie, d'une plaque rosée à rouge un peu sèche ou d'une zone blanchâtre déprimée. Il peut être localisé sur les parties du corps habituellement non couvertes (tête et cou).

En savoir plus : bit.ly/vlm-cbc



Le carcinome neuroendocrine à cellules de Merkel

Il se présente sous la forme d'un nodule (boule), ferme, rosé, rouge ou violacé, non douloureux. Il atteint surtout les personnes âgées, à peau claire. Généralement localisé sur les zones non couvertes par les vêtements, le visage surtout, il est lié à l'exposition solaire mais il touche aussi souvent des personnes dont les défenses immunitaires sont diminuées du fait d'une maladie (cancer) et/ou d'un traitement (patients greffés).

En savoir plus : bit.ly/vlm-cellules-merkel



J'ouvre l'œil et je consulte au moindre doute

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.vaincrelemelanome.fr

Les sarcomes

Le dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand, touche des personnes entre 20 et 40 ans, Il prend la forme d'un placard dur rouge/violacé ou couleur de la peau normale.

L'histiocytome fibreux malin, le plus fréquent des sarcomes, surtout chez des hommes de plus de 70 ans, prend la forme d'une masse sous une peau normale ou abimée.

Le fibroxanthome atypique, prend la forme d'un nodule apparaissant sur des zones de peau exposées chez des personnes âgées.

Quant à l'angiosarcome de Kaposi, il entraîne l'apparition de taches, plaques, nodules rouges sur la peau et les muqueuses et parfois atteint plus profondément d'autres organes. Il est lié à un virus (herpès virus humain 8) qui touche soit des personnes âgées vivant dans le bassin méditerranéen, soit des personnes souffrant d'une baisse des défenses immunitaires et notamment infectées par le virus du sida.

En savoir plus : bit.ly/vlm-sarcomes

Les cancers annexiels

Leur aspect n'est guère « spécifique » : nodules de couleur variée, plaques plus ou moins épaisses, croûteuses parfois suintantes, formations en relief exubérantes, plaies... Ils touchent surtout les personnes âgées.

En savoir plus : bit.ly/vlm-annexiels

Le carcinome épidermoïde cutané (CEC)

Précédé ou pas de lésions « précancéreuses », plusieurs caractéristiques sont retrouvées dans le CEC :

On trouve des CEC se résumant à une plaie croûteuse sur une base dure, des formes alliant bourgeonnement et ulcération, ou encore très « bourgeonnants » en chou-fleur et compliquant une plaie chronique souvent au niveau du visage, de la nuque, du décolleté, des mains et des membres inférieurs ou au niveau des muqueuses génitales.

Les lésions « précancéreuses » qui peuvent précéder un CEC :

- Les kératoses actiniques se présentent sous forme de taches rugueuses ou croûteuses, brunâtres, parfois rouges ; parfois elles ont un développement exubérant parvenant à réaliser une véritable « corne ».



- La maladie de Bowen se présente sous la forme d'une plaque rouge irrégulière.



En savoir plus : bit.ly/vlm-cec



Les points sur la peau illustrent des zones à risque, souvent mal protégées du soleil.

Les cancers cutanés « à distance »

Certaines cellules du sang peuvent proliférer de manière anormale dans la peau provoquant par exemple des lymphomes cutanés.

Bien qu'ayant un mécanisme assez proche, la maladie de Paget mammaire est particulière : des plaques rouges à limites nettes qui démangent et parfois suintent au niveau du mamelon et de l'aréole du sein. Elle est presque toujours liée à un cancer du sein.

Il existe aussi de rares cas de maladie de Paget « extra mammaire » touchant la vulve, le périnée, les aisselles ; l'aspect est le même mais il n'existe pas toujours un cancer « sous-jacent ».

En savoir plus : bit.ly/vlm-a-distance

Vaincre le
mélanome
et autres cancers de la peau

Avec le soutien institutionnel de **SANOFI**